

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 8 **Periodo di Rilevazione: 27/08/2018 - 01/09/2018**

ORGANIZZAZIONE: APOUNASCO - Unasco

STADIO FENOLOGICO : Ingrossamento drupe

COMPRENSORIO:

VV COLLINA VIBONESE

BRIATICO
FILANDARI
FRANCICA
LIMBADI
MILETO
PIZZONI
ROMBIOLO
SAN CALOGERO
SAN COSTANTINO CALABRO
SAN GREGORIO D'IPPONA
SAN NICOLA DA CRISSA

VV COSTA VIBONESE

BRIATICO
CESSANITI
PARGHELIA
SAN CALOGERO
ZACCANOPOLI
ZAMBRONE
ZUNGRI

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
VV COSTA VIBONESE	7,6	5,5	10%	↑	
VV COLLINA VIBONESE	2,53	3,42	10%	↑	

CONSIGLI PER LA DIFESA

1) Andamento del parassita:

Rispetto alla settimana precedente il numero delle catture nella collina vibonese è in lieve diminuzione, viceversa per quanto riguarda il n. di catture lungo la costa che è in aumento, ma sempre sotto la soglia, dal prelievo e successivo controllo delle olive si riscontra una percentuale di infestazione sotto la soglia di intervento.

2) Andamento climatico e previsioni:

Le condizioni climatiche hanno subito un miglioramento rispetto alla settimana precedente, tutta la settimana è stata caratterizzata da clima tipicamente estivo con temperature che si aggirano intorno alla media del periodo (26-29°C)

3) Interventi fitosanitari:

La percentuale d'infestazione si registra sotto la soglia d'intervento fissata al 10%.

Nel caso di uliveti la cui produzione è destinata al consumo da mensa si consiglia di effettuare trattamenti utilizzando prodotti dotati di lunga persistenza d'azione ed adeguati a contenere sia lo sviluppo delle larve che degli adulti della mosca, quali: Dimetoato, Formotion, Triclorfon, Deltametrina; per gli uliveti condotti con il metodo dell'agricoltura biologica intervenire con Spinosad ripetendo il trattamento in caso di pioggia.

Si consiglia di monitorare costantemente il proprio uliveto allo scopo di tenere sotto controllo il volo degli adulti.

