

## REG. CE 2080/05

**SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA**  
**ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA**

### COMUNICATO FITOSANITARIO N. 1 DAL 28/07/2008 AL 01/08/2008

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito [www.apounasco.it](http://www.apounasco.it) e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

#### PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Comuni	
<b>ZONA 1</b>	Francica - Mileto - Gerocarne - Soriano Calabro
<b>ZONA 2</b>	San Costantino Calabro - Ionadi - Cessaniti
<b>ZONA 3</b>	Zambrone
<b>ZONA 4</b>	San Calogero - Rombiolo
<b>ZONA 5</b>	Joppolo

**Fase fenologica:** Accrescimento frutti  
**Patogeno Monitorato:** Mosca delle olive



	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
<b>ZONA 1</b>	0,75	2,25	1,50	<b>1,50</b>	10	1_2
<b>ZONA 2</b>	0,60	1,60	1,10	<b>1,80</b>	10	1_2
<b>ZONA 3</b>	1,00	2,00	1,50	<b>2,50</b>	10	1_2
<b>ZONA 4</b>	1,33	4,33	2,83	<b>3,00</b>	10	1_2
<b>ZONA 5</b>	1.50	4.50	3,00	<b>4,00</b>	10	1_2

Zona	Interventi consigliati
<b>Tutte</b>	L'attività di monitoraggio eseguita, tenendo in piena considerazione sia il numero degli insetti catturati dalle trappole, sia dall'analisi dei frutti prelevati nei vari appezzamenti, non ha evidenziato una significativa attività parassitaria da parte della mosca delle olive ( <i>Bactrocera oleae</i> ). Il perdurare delle temperature elevate con medie giornaliere di circa 32° C. rallenta l'attività del parassita devitalizzando le uova e gli stadi giovanili dell'insetto. Si consiglia di non effettuare alcun trattamento.

**Note:**

Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica. Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428