

REG. CE 867/08

SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA
ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA

COMUNICATO FITOSANITARIO N. 10 DAL 20/09/2010 AL 25/09/2010

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito www.apounasco.it e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Frantoi, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

| ZONE | |
|--------|---|
| ZONA 1 | Fascia del fiume Mesima |
| ZONA 2 | Fascia collinare da Vibo Valentia a Mileto |
| ZONA 3 | Fascia costiera Tirrenica da Cessaniti a Briatico |
| ZONA 4 | Fascia costiera Tirrenica da Zambrone a Drapia |
| ZONA 5 | Fascia collinare da Rombiolo a San Calogero |
| ZONA 6 | Fascia costiera Tirrenica da Monteporo a Joppolo |

Fase fenologica: Accrescimento frutti
Patogeno Monitorato: Mosca delle olive



| | Numero di insetti catturati per trappola | | | Infestazione % | Soglia d'intervento | |
|--------|--|---------|-------|----------------|---------------------|-------|
| | Minima | Massima | Media | | olio | mensa |
| ZONA 1 | 5,88 | 9,13 | 7,50 | 9,75 | 10 | 1_2 |
| ZONA 2 | 5,67 | 9,33 | 7,50 | 7,67 | 10 | 1_2 |
| ZONA 3 | 6,00 | 7,50 | 6,75 | 9,00 | 10 | 1_2 |
| ZONA 4 | 4,50 | 8,50 | 6,50 | 9,00 | 10 | 1_2 |
| ZONA 5 | 5,00 | 8,33 | 6,67 | 9,67 | 10 | 1_2 |
| ZONA 6 | 6,50 | 11,50 | 9,00 | 10,50 | 10 | 1_2 |

| Zona | Interventi consigliati |
|-------|--|
| Tutte | Anche questa settimana l'attività di monitoraggio eseguita, in tutte le aziende pilota, tenendo in piena considerazione sia il numero degli insetti catturati dalle trappole, sia dall'analisi dei frutti prelevati nei vari appezzamenti, ha evidenziato una significativa attività parassitaria da parte della mosca delle olive (<i>Bactrocera oleae</i>). Nel corso della settimana si è registrata una attività temporalesca con piogge sparse con il conseguente abbassamento della temperatura (26 - 28° C.), ciò può essere causa di un ulteriore aumento della popolazione, mantenere alto il livello di guardia. |

Note:

Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica.

Per le aziende in regime di agricoltura biologica e/o integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Si ricorda che con l'approssimarsi del periodo autunnale aumenta la probabilità di temporali improvvisi, pertanto, al fine di evitare dilavamento dei terreni, allagamenti e ristagni idrici si consiglia il ripristino e la pulizia delle scoline. Inoltre, evitare di eseguire fresature sui terreni in pendio.

Per eventuale richiesta di assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428 o 0961/746585