

REG. CE 2080/05

SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA

ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA

COMUNICATO FITOSANITARIO N. 11 DAL 06/10/2008 AL 10/10/2008

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito www.apounasco.it e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Comuni

ZONA 1	Francica - Mileto - Gerocarne - Soriano Calabro
ZONA 2	San Costantino Calabro - Ionadi - Cessaniti
ZONA 3	Zambrone
ZONA 4	San Calogero - Rombiolo
ZONA 5	Joppolo

Fase fenologica: Accrescimento frutti
Patogeno Monitorato: Mosca delle olive



	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
ZONA 1	3,13	5,38	4,25	7,25	10	1_2
ZONA 2	3,80	6,00	4,90	5,60	10	1_2
ZONA 3	5,50	7,00	6,25	6,50	10	1_2
ZONA 4	4,00	6,00	5,00	5,00	10	1_2
ZONA 5	5	7	6,00	6,50	10	1_2

Zona	Interventi consigliati
Tutte	<p>Anche in questa settimana le condizioni climatiche sono state favorevoli allo sviluppo ed alla diffusione del patogeno, l'analisi dei frutti, anche se non in numero molto elevato, evidenziano la presenza di nuove ovodeposizioni, si consiglia pertanto ove possibile di anticipare le operazioni di raccolta, tenendo presente, che si devono rispettare i tempi di carenza indicati sulla confezione del prodotto usato per i precedenti trattamenti, o comunque per come già detto la scorsa settimana: mantenere alto il livello di guardia e se nel caso intervenire utilizzando prodotti dotati di lunga persistenza d'azione ed adeguati a contenere sia lo sviluppo delle larve che degli adulti della mosca quali: (Dimetoato, Formotion, Triclorforn, Deltametrina ecc.).</p> <p>Nel corso della settimana, negli uliveti esaminati, si è riscontrato un aumento di attacchi di Lebbra, malattia fungina dovuta al patogeno <i>Gloeosporium olivarum</i>, anche in questo caso per limitare i danni si consiglia di anticipare le operazioni di raccolta.</p>

Note:
Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica.
Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428

Vibo Valentia lì 13/10/08

Il tecnico
Per. Agr. Pasquale Mercatante