

REG. CE 2080/05

SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA

ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA

COMUNICATO FITOSANITARIO SETTIMANA DAL 10/09/2006 AL 15/09/2006

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito www.apounasco.it e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Comuni		Patogeno Monitorato: Mosca delle olive
ZONA 1	Francica - Mileto - Gerocarne - Soriano Calabro	Fase fenologica: Accrescimento frutti
ZONA 2	San Costantino Calabro - Ionadi - Vibo Valentia	
ZONA 3	Zambrone	
ZONA 4	Joppolo	



	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
ZONA 1	8,64	12,73	10,68	16,82	10	1_2
ZONA 2	8,00	13,00	10,50	16,33	10	1_2
ZONA 3	11,00	15,50	13,25	12,00	10	1_2
ZONA 4	10,00	14,50	12,25	14,50	10	1_2

Zona	Interventi consigliati
Tutte	<p>In tutte le zone monitorate, l'infestazione media messa in evidenza dall'analisi dei frutti, è superiore alla soglia minima d'intervento fissata al 10% per le olive da olio e al 2% per quelle da mensa.</p> <p>Di conseguenza, visto anche l'andamento climatico con temperature intorno ai 20-24° C. molto favorevole allo sviluppo del patogeno, è consigliabile, in tutti quei casi in cui non si è provveduto ad eseguire nessun trattamento chimico, ad intervenire chimicamente con prodotti dotati di lunga persistenza d'azione ed adeguati a contenere sia lo sviluppo delle larve che degli adulti della mosca. I principi attivi utilizzabili possono essere: (Dimetoato, Formotion, Triclorform, Deltametrina ecc).</p> <p>Negli uliveti esaminati si è riscontrato, sui frutti, un aumento di attacchi di Lebbra, malattia fungina dovuta al patogeno Gloeosporium olivarum in quest'ultimo caso si consigliano trattamenti con prodotti rameici.</p>

Note:
Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica.
Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428

Vibo Valentia li 18/09/06

Il tecnico
Per. Agr. Pasquale Mercatante