

## REG. CE 867/08

**SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA**  
**ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA**

### COMUNICATO FITOSANITARIO N. 4 DAL 09/08/2010 AL 14/08/2010

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito [www.apounasco.it](http://www.apounasco.it) e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Frantoi, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

#### PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

ZONE		
ZONA 1	Fascia del fiume Mesima	
ZONA 2	Fascia collinare da Vibo Valentia a Mileto	
ZONA 3	Fascia costiera Tirrenica da Cessaniti a Briatico	<b>Fase fenologica:</b> Indurimento del nocciolo
ZONA 4	Fascia costiera Tirrenica da Zambrone a Drapia	<b>Patogeno Monitorato:</b> Mosca delle olive
ZONA 5	Fascia collinare da Rombiolo a San Calogero	
ZONA 6	Fascia costiera Tirrenica da Monteporo a Joppolo	



	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
ZONA 1	4,25	7,50	5,88	<b>6,63</b>	10	1_2
ZONA 2	5,67	7,67	6,67	<b>6,00</b>	10	1_2
ZONA 3	4,50	8,50	6,50	<b>6,50</b>	10	1_2
ZONA 4	4,50	6,50	5,50	<b>6,50</b>	10	1_2
ZONA 5	5,33	7,67	6,50	<b>6,33</b>	10	1_2
ZONA 6	3,50	8,50	6,00	<b>6,50</b>	10	1_2

Zona	Interventi consigliati
Tutte	Questa settimana è stata caratterizzata da condizioni climatiche non favorevoli allo sviluppo ed alla diffusione della mosca delle olive, infatti le temperature elevate con medie giornaliere di circa 32° C. rallentano l'attività del parassita devitalizzando le uova e gli stadi giovanili dell'insetto. L'analisi delle drupe campionate dimostra che in tutte le zone oggetto di monitoraggio la soglia minima d'intervento fissata al 10% per le olive da olio non è stata raggiunta pertanto non è consigliabile effettuare trattamenti contro il patogeno.

**Note:**  
Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica.  
Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale richiesta di assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428 o 0961/746585