

REG. CE 2080/05

SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA
ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA

COMUNICATO FITOSANITARIO N. 4 DAL 18/08/2008 AL 22/08/2008

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito www.apounasco.it e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Comuni

ZONA 1 Francica - Mileto - Gerocarne - Soriano Calabro
ZONA 2 San Costantino Calabro - Ionadi - Cessaniti
ZONA 3 Zambrone
ZONA 4 San Calogero - Rombiolo
ZONA 5 Joppolo

Fase fenologica: Accrescimento frutti
Patogeno Monitorato: Mosca delle olive



	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
ZONA 1	0,50	2,38	1,44	2,38	10	1_2
ZONA 2	1,80	2,80	2,30	3,00	10	1_2
ZONA 3	1,50	5,00	3,25	2,50	10	1_2
ZONA 4	2,00	4,33	3,17	3,67	10	1_2
ZONA 5	2,00	3,50	2,75	4,50	10	1_2

Zona	Interventi consigliati
Tutte	In tutte le zone in esame nel corso della settimana appena trascorsa l'attività di monitoraggio eseguita non ha rilevato significative variazioni di attività del parassita rispetto alla settimana precedente, ciò è dovuto principalmente alle condizioni climatiche non favorevoli allo sviluppo ed alla diffusione della mosca delle olive, infatti il perdurare delle temperature elevate con medie giornaliere di circa 32° C. rallenta l'attività del parassita devitalizzando le uova e gli stadi giovanili dell'insetto. Negli uliveti la cui produzione è destinata alla produzione di olio non sono consigliabili trattamenti, è consigliabile invece intervenire negli uliveti la cui produzione è destinata ad olive da mensa utilizzando prodotti dotati di lunga persistenza d'azione ed adeguati a contenere sia lo sviluppo delle larve che degli adulti della mosca quali: (Dimetoato, Formotion, Triclorforn, Deltametrina ecc.).

Note:

Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica.

Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428