

REG. CE 2080/05

**SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA
ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA**

COMUNICATO FITOSANITARIO SETTIMANA DAL 17/09/2007 AL 23/09/2007

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito www.apounasco.it e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

| Comuni | |
|---------------|---|
| ZONA 1 | Francica - Mileto - Gerocarne - Soriano Calabro |
| ZONA 2 | San Costantino Calabro - Ionadi - Vibo Valentia - Cessaniti |
| ZONA 3 | Zambrone |
| ZONA 4 | Joppolo |

Patogeno Monitorato: Mosca delle olive
Fase fenologica: Accrescimento frutti



| | Numero di insetti catturati per trappola | | | Infestazione % | Soglia d'intervento | |
|---------------|--|---------|-------|----------------|---------------------|-------|
| | Minima | Massima | Media | | olio | mensa |
| ZONA 1 | 3,22 | 4,33 | 3,78 | 3,78 | 10 | 1_2 |
| ZONA 2 | 3,86 | 5,14 | 4,50 | 3,00 | 10 | 1_2 |
| ZONA 3 | 3,50 | 6,50 | 5,00 | 4,50 | 10 | 1_2 |
| ZONA 4 | 5,50 | 9,00 | 7,25 | 3,50 | 10 | 1_2 |

| Zona | Interventi consigliati |
|--------------|--|
| Tutte | <p>In tutte le zone monitorate, l'infestazione media messa in evidenza dall'analisi dei frutti, è inferiore alla soglia minima d'intervento fissata al 10% per le olive da olio e superiore al 2% per quelle da mensa.</p> <p>Di conseguenza, è consigliabile, limitatamente agli oliveti la cui produzione è destinata ad olive da mensa, intervenire chimicamente con prodotti dotati di lunga persistenza d'azione ed adeguati a contenere sia lo sviluppo delle larve che degli adulti della mosca. I principi attivi utilizzabili possono essere: (Dimetoato, Formotion, Triclorforn, Deltametrina ecc.). Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio oliveto per verificare la percentuale di infestazione attiva; prelevare n. 10 olive per pianta da circa 10 piante per ettaro, nella fase di prelievo si deve tenere conto della posizione della drupa sulla pianta (esposizione ed altezza) e portarle o contattare il tecnico dell'associazione.</p> <p>Negli uliveti esaminati si è riscontrato un attacco di Lebbra, malattia fungina dovuta al patogeno Gloeosporium olivarum in quest'ultimo caso si consigliano trattamenti con prodotti rameici.</p> |

Note:

Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428

Vibo Valentia li 24/09/07

Il tecnico
Per. Agr. Pasquale Mercatante