

REG. CE 867/08

SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA

ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA

COMUNICATO FITOSANITARIO SETTIMANA DAL 03/08/2009 AL 09/08/2009

Il presente bollettino viene pubblicato allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Catanzaro indicazioni e consigli utili per il controllo della Mosca delle olive. Oltre che sul sito dell'OP www.apounasco.it il bollettino viene affisso presso i comuni oggetto del controllo e presso rivendite di prodotti per l'agricoltura; Per informazioni telefonare, ore ufficio, al numero 0961/746585

PROVINCIA DI CATANZARO

Fase fenologica: Indurimento del nocciolo

Patogeno Monitorato: Mosca delle olive



COMUNI

ZONA 1	Amaroni
ZONA 2	Petrizzi zona bassa - Squillace Lido - Sarrottino(fraz.Tiriolo)
ZONA 3	Catanzaro - Simeri Crici
ZONA 4	Belcastro - Sersale - Botricello
ZONA 5	Magisano - Albi - Sellia

	Numero di insetti maschi catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento %	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
ZONA 1	3,00	9,00	6,00	5,00	10	1_2
ZONA 2	4,50	8,83	6,67	3,43	10	1_2
ZONA 3	2,40	6,80	4,60	2,83	10	1_2
ZONA 4	2,25	4,75	3,50	2,60	10	1_2
ZONA 5	5,00	9,00	7,00	4,00	10	1_2

Zona	Interventi consigliati
Tutte	Nella settimana appena trascorsa è stato effettuato il controllo delle trappole per il monitoraggio della mosca ed eseguito il prelievo di un campione di olive per verificare la presenza di un eventuale attacco dell'insetto. Dalla verifica delle trappole in tutte le zone controllate non si sono evidenziate catture di rilievo ed anche il controllo delle olive, prelevate in numero di 100 per azienda, ha messo in evidenza un numero di punture fertili (presenza di uova e larvette) comprese tra 2 e 5%. Allo stato attuale, quindi, non è stata superata la soglia di intervento fissata al 10% per gli uliveti da olio e non è necessario eseguire alcun trattamento chimico; mentre per quelli da mensa la stessa è stata superata consigliando, dove si ritenga necessario, di intervenire chimicamente con prodotti ad azione citotropica.

Note:
Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica. Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi in alla OP al n. 0961/746585

Catanzaro lì 10/08/09

Il tecnico
Dott.Agr. Tedesco Paolo