

REG. CE 2080/05

**SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA
ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA**

COMUNICATO FITOSANITARIO SETTIMANA DAL 14/10/2007 AL 21/10/2007

Il presente bollettino viene pubblicato allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Catanzaro indicazioni e consigli utili per il controllo della Mosca delle olive. Oltre che sul sito dell'OP www.apounasco.it il bollettino viene affisso presso i comuni oggetto del controllo e presso rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane; Per informazioni telefonare, ore ufficio, al numero 0961/746585

PROVINCIA DI CATANZARO

Fase fenologica: Invaiaitura



Patogeno Monitorato: Mosca delle olive

COMUNI

ZONA 1	Santa Caterina dello Ionio - Amaroni
ZONA 2	Petrizzi - Squillace Lido - Roccelletta di Borgia - Sarrotino(fraz.Tiriolo)
ZONA 3	Catanzaro - Sellia - Simeri Cricchi
ZONA 4	Belcastro - Sersale - Botricello
ZONA 5	Feroletto Antico - Pianopoli - Lamezia Terme



	Numero di insetti maschi catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento %	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
ZONA 1	5,00	6,67	5,83	9,33	10	1_2
ZONA 2	5,00	8,50	6,75	10,33	10	1_2
ZONA 3	5,88	8,88	7,38	10,63	10	1_2
ZONA 4	5,50	7,25	6,38	9,25	10	1_2
ZONA 5	6,00	10,00	8,00	10,00	10	1_2



Zona	INTERVENTI CONSIGLIATI
Tutte	<p>Le condizioni climatiche della settimana appena trascorsa sono state tipiche del periodo autunnale il cielo è stato coperto con piovaski sparsi. Le olive sono nella fase fenologica della invaiaitura (cambiamento di colore dal verde al nero violaceo) e non si riscontra, dall'analisi dei frutti, nessun incremento di infestazione attiva dovuto a nuovi attacchi della mosca. E' consigliabile procedere alla raccolta, in quanto, eseguita in questa fase fenologica, consente di ottenere un olio di alta qualità e dall'intenso profumo di fruttato.</p> <p>Inoltre, la ricchezza in polifenoli ne migliora la conservabilità.</p> <p>Prima di effettuare la raccolta, nel caso in cui siano stati effettuati dei trattamenti antiparassitari, rispettare il tempo di carenza del prodotto utilizzato.</p>

Note:

Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica.

Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0961/746585

Catanzaro li 22/10/07

I tecnici
Dott.Agr. Tedesco Paolo – Agr. Falvo Gianfranco