

REG. CE 2080/05

**SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA
ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA**

COMUNICATO FITOSANITARIO SETTIMANA DAL 21/10/2007 AL 28/10/2007

Il presente bollettino viene pubblicato allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Catanzaro indicazioni e consigli utili per il controllo della Mosca delle olive. Oltre che sul sito dell'OP www.apounasco.it il bollettino viene affisso presso i comuni oggetto del controllo e presso rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane; Per informazioni telefonare, ore ufficio, al numero 0961/746585

PROVINCIA DI CATANZARO

Fase fenologica: Invaiaura



Patogeno Monitorato: Mosca delle olive

COMUNI

ZONA 1	Santa Caterina dello Ionio - Amaroni
ZONA 2	Petrizzi - Squillace Lido - Roccelletta di Borgia - Sarrotino(fraz.Tiriolo)
ZONA 3	Catanzaro - Sellia - Simeri Crichi
ZONA 4	Belcastro - Sersale - Botricello
ZONA 5	Feroleto Antico - Pianopoli - Lamezia Terme



	Numero di insetti maschi catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento %	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
ZONA 1	2,33	4,00	3,17	7,00	10	1_2
ZONA 2	3,33	4,83	4,08	7,67	10	1_2
ZONA 3	3,13	4,75	3,94	8,88	10	1_2
ZONA 4	3,25	4,50	3,88	7,75	10	1_2
ZONA 5	4,00	6,00	5,00	8,50	10	1_2



Zona	INTERVENTI CONSIGLIATI
Tutte	Le olive sono nella fase fenologica della invaiatura (cambiamento di colore dal verde al nero violaceo) e non si riscontra, dall'analisi dei frutti, nessun incremento di infestazione attiva dovuto a nuovi attacchi della mosca. E' consigliabile procedere alla raccolta, in quanto, eseguita in questa fase fenologica, consente di ottenere un olio di alta qualità e dall'intenso profumo di fruttato. Inoltre, la ricchezza in polifenoli ne migliora la conservabilità. Nella settimana appena trascorsa le condizioni climatiche sono state tipiche del periodo autunnale. Prima di effettuare la raccolta, nel caso in cui siano stati effettuati dei trattamenti antiparassitari, è obbligatorio rispettare il tempo di carenza del prodotto utilizzato.

Note:

Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropa.

Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0961/746585

Catanzaro li 29/10/07

I tecnici
Dott.Agr. Tedesco Paolo – Agr. Falvo Gianfranco