

REG. CE 867/08

SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA

ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA

COMUNICATO FITOSANITARIO SETTIMANA DAL 19/10/2009 AL 25/10/2009

Il presente bollettino viene pubblicato allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Catanzaro indicazioni e consigli utili per il controllo della Mosca delle olive. Oltre che sul sito dell'OP www.apounasco.it il bollettino viene affisso presso i comuni oggetto del controllo e presso rivendite di prodotti per l'agricoltura; Per informazioni telefonare, ore ufficio, al numero 0961/746585

PROVINCIA DI CATANZARO

Fase fenologica: Invaiaitura

Patogeno Monitorato: Mosca delle olive

Mouche de l'olive



COMUNI

ZONA 1	Amaroni
ZONA 2	Soverato - Petrizzi zona bassa - Squillace Lido
ZONA 3	Catanzaro - Sarrottino(fraz.Tiriolo) - Simeri Crichi
ZONA 4	Belcastro - Sersale - Botricello
ZONA 5	Albi - Magisano - Sellia

	Numero di insetti maschi catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento %	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
ZONA 1	13,00	21,00	17,00	16,00	10	1_2
ZONA 2	13,00	18,00	15,50	15,33	10	1_2
ZONA 3	12,11	18,67	15,39	15,44	10	1_2
ZONA 4	10,50	17,50	14,00	14,50	10	1_2
ZONA 5	10,67	15,33	13,00	14,33	10	1_2

Giorno	Temperatura			Umidità %
	Minima	Massima	Media	
Lunedì	7°C	12°C	10 °C	84%
Martedì	6°C	16°C	11 °C	83%
Mercoledì	8°C	20°C	15 °C	73%
Giovedì	17°C	22°C	20°C	88%
Venerdì	15°C	22°C	18°C	82%
Sabato	13°C	17°C	16°C	89%
Domenica	12°C	21°C	16°C	82%

Fonte www.ilmeteo.it

Zona	Interventi consigliati
Tutte	Le condizioni climatiche della settimana sono state variabili alternando condizioni di bel tempo a piogge più o meno intense, lo stesso dicasi per le temperature basse nella prima parte della settimana e più alte verso la fine. Il controllo delle aziende campione, nelle diverse zone, evidenzia un numero di catture per trappola mediamente compreso tra 13 e 17. Nel corso della visita è stato fatto il prelievo di 100 drupe per la determinazione dell'infestazione attiva (larve + uova). Dal controllo si evidenzia che la stessa ha superato la soglia di intervento fissata al 10 % raggiungendo valori compresi tra 14,33 è 16%. Si consiglia, pertanto, per le aziende che intendono posticipare la raccolta, di eseguire un trattamento chimico con prodotti adeguati a contenere lo sviluppo delle larve e ridurre il volo degli adulti. Tra i prodotti da utilizzare vengono consigliati quelli ad azione citotropica (Dimetoato, Imidaclorpid,ecc). Nel caso in cui è stato eseguito un trattamento chimico, prima di effettuare la raccolta è importante rispettare il tempo di carenza del prodotto utilizzato (lasso di tempo che deve trascorrere dall'ultimo trattamento alla raccolta) che si trova nella scheda tecnica del prodotto. Per le aziende in regime di agricoltura biologica usare solo prodotti ammessi dai regolamenti vigenti. Tra questi prodotti possiamo ricordare lo spinosad. E' consigliabile eseguire un trattamento preventivo contro l'occhio di pavone, nelle zone maggiormente soggette ad attacco, con prodotti a base di rame.

Note:

Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica.

Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0961/746585

Catanzaro lì 26/10/2009

Il tecnico

Dott. Agr. Tedesco Paolo